

SUGESTÃO DE ANALGESIA PARA PRESCRIÇÃO

Pelo corpo clínico do Hcor
(Em pacientes adultos)



Atenção: Antes da prescrição, verificar se não há alergias ou intolerância / contraindicação das drogas abaixo.

DOR LEVE / FRACA

Primeira opção	Dipirona 1 ampola EV 6/6h (20-30mg/kg 6/6h) Máx. 5g/dia
Segunda opção	Cetoloraco 30 mg IV 8/8h
Resgate – dor não controlada	Tramadol 100 mg + SF 0,9% 100ml IV até 6/6h

DOR MODERADA

Seguir sugestão acima e acrescentar:


- Oxicodona (Oxycontin) 10 mg VO 12/12h
- Se dor não controlada, associar Morfina 10mg + AD 10 ml se dor - solução decimal 2ml IV até dor em score 3
- Associar Ondansetron 8 mg IV até 8/8h para evitar náuseas e vômitos.

DOR FORTE

Seguir sugestão acima, aumentar dose de Oxicodona e manter morfina.

- Oxicodona (Oxycontin) 20 mg VO 12/12h
- Morfina 10mg + AD 10 ml se dor - solução decimal 2ml IV até dor em score 3
- Fenergan ½ ampola IM 12/12h, se prurido

Escala Numérica Verbal



Em caso de eventos colaterais importantes e/ou não controle da dor em até 48 horas, acionar o especialista em dor através do [grupo de Dor Hcor](#).

<http://intrsv4/ProtocolosInstitucionais/Dor/tabid/1065/Default.aspx>